


isosource® standard

DER BASISBEGLEITER



isosource® standard fibre

DER BASISBEGLEITER MIT BALLASTSTOFFEN



Normokalorische SONDENNAHRUNG

- Normokalorisch (1,0 kcal/ml)
- Ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei
- Lactosefrei (< 0,050 g/100 ml)
- Niedrige Osmolarität (239 mOsm/l)
- Diätetisch vollständig
- Verordnungsfähig

Normokalorische SONDENNAHRUNG MIT BALLASTSTOFFEN

- Normokalorisch (1,03 kcal/ml)
- Mit patentiertem Ballaststoffmix IS50™
- Glutenfrei
- Lactosefrei (< 0,050 g/100 ml)
- Niedrige Osmolarität (266 mOsm/l)
- Diätetisch vollständig
- Verordnungsfähig

Indikationen

Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei:

- Unzureichender Deckung des normalen Nährstoffbedarfes
- Patient:innen mit Kontraindikation für Ballaststoffe

Dosierung

Zur ausschließlichen Ernährung:
1.500–2.000 ml pro Tag

Zur ergänzenden Ernährung:
≥ 500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung

Lagerung

Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Nährstoffe

FETT:

Ernährungsphysiologisch hochwertige pflanzliche Öle (Raps und Sonnenblume), mittelkettige Triglyceride (MCT) und Fischöl

KOHLLENHYDRATE:

Kommen hauptsächlich aus Maltodextrin

EIWEISS:

Hochwertiges Milcheiweiß

BALLASTSTOFFE:

Ohne Ballaststoffe

Wichtige Hinweise

- Unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Geeignet ab 3 Jahren
- Als einzige Nahrungsquelle geeignet
- Nicht mit anderer Nahrung oder Arzneimitteln mischen
- Nicht zur parenteralen Verwendung

	Art.-Nr.	PZN St.	PZN VE
12 x 500 ml	12138996	07756037	07756020
9 x 1.000 ml	12143836	07756066	07756043

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

Indikationen

Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei:

- Unzureichender Deckung des normalen Nährstoffbedarfes
- Intaktem Gastrointestinaltrakt
- Langzeiternährung mit Ballaststoffen

Dosierung

Zur ausschließlichen Ernährung:
1.500–2.000 ml pro Tag

Zur ergänzenden Ernährung:
≥ 500 ml pro Tag oder nach ärztlicher Anweisung

Lagerung

Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch schütteln. Bei Verwendung des Spike- oder Universaladapters innerhalb von 24 Stunden applizieren. Geöffnete Flasche wiederverschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

	Art.-Nr.	PZN St.	PZN VE
12 x 500 ml	12139014	07756103	07756089
9 x 1.000 ml	12140437	07756132	07756126

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).