

# Suprasorb® G

Gel-Kompresse  
Pansement gel  
Gel Wound Dressing  
Apósito de gel  
Compressa de gel  
Compresa en gel  
Gelkompres  
Gel-kompres  
Gel-kompresso  
Gelkompress

Geelhaavasidos  
Gelová kompreza  
Gélová kompreza  
Gélkötzszer  
Opatrunk želový  
Obloga za ranu z gelom  
Gel kompreza za ranu  
Επίθεμα τραύματος γέλιας  
Jelra örtűszü  
ضمادة هيدروجيلا

## de Gebrauchsanweisung

**Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale**  
Die Suprasorb® G Gel Kompresse ist eine nicht klebende Hydrogel-Kompresse mit hohem Wassergehalt. Es handelt sich um ein zweiteiliges, klar, transparentes Hydrogel, das um eine stützende blaue Polyäthylenmatrix geformt ist. Das Gel ist wasserdampf- und gasdurchlässig.

Die Suprasorb® G Gel Kompresse sorgt an der Oberfläche der Wunde für ein feuchtes Wundmilieu. Sofern sichergestellt wird, dass die Kompresse bei der Anwendung nicht austrocknet, bleibt sie beim Entfernen nicht am darunterliegenden Gewebe haften.

### Produktzusammensetzung

Das Produkt enthält etwa 70 % Wasser. Die verbleibenden 30 % bestehen aus aufgepolvtem Acrylpolymer auf Basis eines Tauratderivats mit Phenoxethanol als Konserverungsmittel.

### Zweckbestimmung

Zur Behandlung von Verbrennungen, Verbrühungen, Strahlenschäden, epidermalen Schäden und Ulcus cruris.

### Indikationen

Die Suprasorb® G Gel Kompresse kann als Wundkontaktschicht angewendet werden, hat eine kühlende und lindernde Wirkung und sorgt für die Absorption und Retention von Exsudat. Sie ist hervorragend geeignet für die Behandlung von Verbrennungen, Schäden durch Strahlentherapie, epidermalen Schäden und Ulcus cruris geeignet. Sie kann zur Behandlung von nozizeptiven Wundschmerzen und zur Unterstützung des autolytischen Debridements durch Hydratation von nekrotischem Gewebe und weichen Belägen angewendet werden. Sie ist für die Anwendung bei schmerzhaften Wunden geeignet. Die Gel-Kompresse kann bei Bedarf in Kombination mit Sekundärverbindungen angewendet werden. Die Suprasorb® G Gel Kompresse wird zur Anwendung bei nicht mit exsudierenden Wunden empfohlen und kann auch unter Kompression verwendet werden. Die Suprasorb® G Gel Kompresse ist zur Versorgung von oberflächlichen Verbrennungen bis zur mittleren Hautschicht angezeigt, d. h. bei Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

### Kontraindikationen

Die Suprasorb® G Gel Kompresse darf nicht angewendet werden:  
• bei stark blutenden Wunden  
• bei Verbrennungen dritten Grades  
• zum Einbringen in tiefe, schmale Wundhöhlen oder Nebenhöhlen  
• bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile der Gel Kompresse

### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.  
In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Das Produkt darf nicht direkt auf die Wunde aufgetragen werden.  
• Nicht mit Alkohol oder Halbwertszeitlösungen anwenden.

• Nur zur kurzfristigen Anwendung. Die Wundversorgung mit der Gel-Kompresse nicht länger als 30 Tage durchführen.

• Die Anwendung absetzen, wenn übermäßige Beschwerden oder Reizungen auftreten.

• Wenn die Gel-Kompresse schwierig zu entfernen ist, sollte sie mit Wasser oder Kochsalzlösung befeuchtet werden.

• Wenn Sie Diabetiker sind, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

• Nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder in Irregularitäten besteht.

• Vor Behandlungsschein ist eine genaue Beurteilung der Wunde und des Patienten erforderlich.

• Die Blutstilzung sollte regelmäßig kontrolliert werden. Der Absorptionsprozess kann durch die Suprasorb® G Gel Kompresse beschleunigt werden. Deshalb kann die Wunde trockener werden als erwartet.

• Bei der Anwendung bei schwach exsudierenden Wunden wird eine engmaschige Kontrolle durch das Pflegepersonal empfohlen.

• Wie bei allen Wundverbindungen wird eine regelmäßige Kontrolle des Wundstatus und ggf. eine weitere Verpackung empfohlen (vor allem, wenn klinisch der Verdacht einer Infektion besteht).

• Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Bitte beachten Sie Folgendes: Wenn die durchsichtige Folie an der Innenseite der Einzelverpackung hängt, muss sie vor der Anwendung wieder auf die Gel Kompresse aufgebracht werden. Dazu müssen Handschuhe getragen oder eine Pinzette verwendet werden.

### Hinweise zur Anwendung

#### 1. Anwendung

1. Wählen Sie die Größe der Kompresse so, dass das Gel die Wunde und etwa 25 mm des gesunden Gewebes abdeckt.  
2. Den Wundbereich nach Bedarf reinigen.  
3. Nehmen Sie die sterile Gel Kompresse aus der Verpackung.

### it Istruzioni per l'uso

#### 2. Cambio della medicazione

La compresa in gel Suprasorb® G dovrebbe essere cambiata quando richiesto dalla ferita o dalle condizioni del paziente. Come per tutte le medicazioni assorbenti, è necessario un monitoraggio frequente per assicurarsi che la medicazione non si asciughi e aderisca alla ferita. La medicazione deve essere sostituita quando appare torbida od opaca a causa dell'assorbimento dei liquidi. La medicazione deve essere sostituita al primo segnale di penetrazione del liquido. Se si sospetta un'infezione, si consigliano controlli e sostituzioni frequenti.

Restituire la medicazione dopo 3-7 giorni, o prima nelle seguenti circostanze:

1. Quando diventa torbida od opaca a causa dell'assorbimento di esudato della ferita.

2. Nel trattamento di una ferita infetta può essere necessario sostituirla la medicazione più di frequente.

3. Se necessario, la medicazione può essere impregnata di acqua o soluzione salina per reidratarla prima di rimuoverla.

4. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

5. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

6. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

7. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

8. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

9. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

10. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

11. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

12. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

13. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

14. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

15. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

16. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

17. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

18. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

19. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

20. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

21. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

22. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

23. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

24. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

25. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

26. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

27. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

28. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

29. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

30. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

31. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

32. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

33. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

34. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

35. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

36. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

37. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

38. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

39. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

40. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

41. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

42. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

43. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

44. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

45. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

46. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

47. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

48. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

49. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

50. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

51. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

52. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

53. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

54. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

55. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

56. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

57. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

58. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

59. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

60. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel dal congelatore e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

61. Se la medicazione diventa gelata. Per garantire la funzionalità della medicazione, rimuovere il gel

