Suprasorb® C

Hydrokolloid-Verband
Pansement hydrocolloïde
Hydrocolloid Dressing
Apósito de hidrocoloide
Penso idrocolóide
Medicazione idrocolloidale
Hydrocolloïdverband
Hydrokolloid-forbindung
Hydrokolloidförband
Hydrokolloid-sårbindning
Hydrokolloidside
Hydrokolloidni obvoj
Hydrokoloidný obväz
Hydrokolloid kötszer
Opatrunek hydrokoloidowy
Hydrokoloidna obloga
Hidrokoloidni povoj za rane
Ύδροκολλοειδές επίθεμα
Pansament hidrocoloidă
Хидроколоидно превръзка за рани
Hidrokolloidside
ضمادة غروانى مائى

STERILE | LOT | 2 | 2 | 30 °C | 60 °C

CE 0123 | MD | EC REP

TÅL Co., Ltd., 70-17, Wonsan-ro, Won-gok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do, 17564, Korea

KTR Europe GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, 63225 Langen, Germany

CH REP

Swiss AR Services GmbH, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Switzerland

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Industriestraße 4, 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com - Made in Korea

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung
Der Suprasorb® H Hydrokolloid-Verband vorfüllt über zwei Lagen, hinterlässt aus unserer absorbierenden Hydrokolloid-Matrix, die auf eine atmungsaktiven Polyurethan-Trägerfolie aufgebracht ist. Die Hydrokolloid-Matrix bildet Gelkissen und bildet ein kohäsives Gel. Zusätzlich zur hohen Exsudatmenge Absorptionsfähigkeit bietet die atmungsaktive Polyurethan-Trägerfolie eine konsistent hohe Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Die Kombination dieser Eigenschaften unterstützt eine optimale feuchte Wundumgebung, minimiert das Risiko der Schädigungen der gesunden Wundumgebungshaut und bietet eine hohe Barriere zu äußeren Tagen.

Indikationen
Suprasorb® H STANDARD ist vorrangig indiziert für die Behandlung von leicht bis mäßig exsudierenden Druckgeschwüren und flachgelagerten Wunden. Suprasorb® H DÜNN und Suprasorb® H STANDARD können für die oberflächlichen Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Hautentnahme und -transplantate, oberflächlich infizierten Ulzera, postoperativen Wunden und Spenderstellen verwendet werden.

Kontraindikationen
- Verbrennungen dritten Grades
- Klinisch infizierte Wunden
- Wunden mit hohem Infektionsrisiko
- Patienten mit einer bekannten Allergie gegen Hydrokolloid-Verbände

Nebenwirkungen
In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Anwendungshinweise
1. Den Wundbereich mit handelsüblicher Kochsalzlösung oder Wasser reinigen.
2. Die Wundumgebungshaut vorsichtig trocknen und schrubbelfrei, dass sie frei von Rückständen ist.
3. Die am besten geeignete Größe und Form des Verbands wählen. Er sollte die Wundränder um 1,5 bis 2 cm überdecken.
4. Die grellen Teil des Schutzpapiers vom Verband entfernen.
5. Den freilegenden Teil des Verbands über dem Wundbett zentrieren und fest anbringen.
6. Die Klebeseite nicht berühren, um eine Kontaminisierung zu minimieren. Dann den kleinen Teil des Schutzpapiers vom Verband entfernen und dieses befestigen.
7. Das Anlegen des Verbands abschließen und daber unbing schrubbelfrei, dass der Ränder

Suprasorb® H
Hydrokolloid dünn
Hydrokolloid Dünn
Hydrocolloid Thin
Hydrocolloïde Mince
Hidrocoloide Delgado
Idrocolloide Sottile
Hydrocolloïde Dunn
Hydrocolloid Tunn
Hydrocolloid Tynn
Hydrocolloid Ohut
Hydrocolloid Tynn
Hydrocolloid Tynn
Hydrocolloid Tynn

Sälytysolosuhteet
Säilytä huoneenlämmössä, valtti kosteita tiloja ja lämpötilan laksa.

Varotoimenpiteet
Hydrokoloidisdetta saa käyttää vain laboratoriot ammatistaisen ohjeiden mukaan. Ohjeidenvastainen käyttö voi aiheuttua ihon ärtinä, etenkin potilaille, joilla on herkkä ihon. Jäykärin on hiidettava haava, jotta ilmeene kiinnien infektion merkkejä, eenen kuin hoito Suprasorb® H ottaa eisten kiinan kinnittyät hyvin. Alun pito paranee, kun sile lapsenen ihon ympärille tulkaa ulkuamme pois paikallaan lisämällä riuvondat tarvittaessa lähketeelleistä tepsia.

Steen vaihtovali
Steen vaihtovali määrtetään haavan kunnon ja erittäkyyden mukaan. Siitetä on pidettävä pakkaluan niin kauan, kuin mahdollista. Jos eritteä tihkuu steen läpi, side on vaihdettava siitämistä. Vaihda side viimeistä 7 käyttäpäivää tai heti, kun se on menyt lämeä läpeen eritteä.

Steen poistaminen
Paina ihoa ja poista side varovasti reunasta alkaen. Vedä sidettä kohti haavan keskusta, kunnes se irtoaa. Puhdista haava tavittaessa.

cs Návod k použití

Popis výrobku
Hydrokoloidní obvaz Suprasorb® H obsahuje hydrofilní absorpční hydrokoloidní matrici, která v nanesené na pokožce, polyuretanovou nosnou fólii. Hydrokoloidní matrice vyčiní absorbuje exsudát a tvoří kohezivní gel. Kromě vynikající absorpční schopnosti nabízí prodlívá, polyuretanová nosná fólie nerozšestnitý vysokou propustnost pro vodní páru. Kombinace tohoto materiálu s jedinečnou vlastností přestřelí rány, minimalizuje riziko zaklíznení zbytků sekundární rány a zajišťuje dobu nošení až dvě hodiny.

Indikace
Suprasorb® H STANDARD je primárně indikovaný na ošetření mierne až stredne exudujúcich akútnych a chronických ran, ktoré sú vhodné na ošetrenie pomocou hydrokoloidnej matrice, ktorá vytvára vlhké prostredie, ktoré podporuje autolytickú debridáciu a zvyšuje bunkovú aktivitu. Obvaz je vhodný na ošetrenie nasledujúcich typov ran: Rany s prebujnenou granulačnou tkanivom, rany s tvorbou nekrózy, rany s prítomnosťou fibrínu, rany s prítomnosťou nekrotickej sekundárnej rany, rany s prítomnosťou nekrotickej sekundárnej rany, rany s prítomnosťou nekrotickej sekundárnej rany